



令和7年11月 1日 社会福祉法人えどがわ 宇喜田おひさま保育園






# ウイルス、どうやってうつる?


🐼 風邪・インフルエンザの

感染に注意!

風邪やインフルエンザのウイルス は、感染している人の

「せき」「くしゃみ」「会話」の 飛沫と一緒に空気中へ広がります。 ウイルスのついた手で目・鼻・口を 触ることでも感染します。





せきやくしゃみのしぶき は2mほど飛ぶので、近くの 人が吸い込むと感染します。

② ウイルスがついた手で目や鼻、 口を触る



ウイルスが付着したものに 手で触れると、ウイルスが手 につきます。ただし、手につ いただけでは感染しません。

ウイルスのついた手で、目や鼻、 口を触るとウイルスが体内に侵入 します。



## 手を洗ってウイルスを洗い流そう

ウイルスが手についても、洗い流せば感染のリスクが下がります。手を洗うときは、せっけんをしっかり泡立てて、指の間、指先までしっかり洗い、流水でよく流しましょう。

# 

## ♀ 予防のポイント

・こまめな<u>手洗い</u>と <u>うがい</u>を習慣に

室内の加湿

- ----(湿度50~60%を目安に)
- <u>睡眠、食事、休息</u>で 免疫カアップ
- ・人が多い場所では

マスクを活用



### ほかにも…

#### <ノロウイルス胃腸炎>

- ・嘔吐・下痢・腹痛・発熱(ロタウイルスほど発熱は 見られず、症状の持続も短く、軽症)
- ・吐き気は数時間~2日程度でおさまりますが、下痢 は長い場合に1~2週間程度続くこともあります。
- ・長期免疫ができにくいため、くり返し感染する。

#### くロタウイルス>

- ・通常、嘔吐・発熱が先行し、次いで下痢の症状。
- ・感染後、1~3日の潜伏期間を経て下痢が生じる。
- 39度以上の高熱が出る事もあります。
- 米とぎ汁の様な白色下痢が見られる事があります。

※乳幼児の場合、脱水症状に気を付けましょう!
※嘔吐物の処理は必ず手袋やマスクを使用し、
直接手や衣服に触れないようにし次亜塩素酸
ナトリウム等で消毒すると効果的です。